

Informacje dla Pacjenta

Został Pan(i) zakwalifikowany(a) do operacji w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi 5WSzK w Krakowie, proszę zapoznać się z informacjami poniżej:

• Schorzenie laryngologiczne często nie jest jedynym Państwa problemem zdrowotnym. Proszę zwrócić uwagę na zażywane leki, zwłaszcza, czy nie stosujecie Państwo leków zmniejszających krzepliwość krwi, takich jak:

-**Abrea, Acard, Acesan, Anacard, Aspifox, Aspicon, Aspirin cardio, Cardiopirin, Duoplavin, Encopirin, Hascopirin, Lecardi, Polocard, Proficar.**

-**Acenokumarol, Aclotin, Apo-clodin, Bewim, Brillique, Cilostazol, Cilostop, Cilozek, Decilosal, Efient, Eliquis, Lixiana, Ifapidin, Integrillin, Noclaud, Sintrom, Stepcil, Sulovas, Pradaxa, Warfin, Xarelto.**

-**Agrex, Areplex, Carder, Clopidix, Clopidogrel, Grepid, Iclopil, Pegorel, Plavix, Plavocorin, Trombex, Vixam, Zyllt.**

Wszystkie wyżej wymienione leki nie powinny być stosowane przed planowanymi operacjami.

W porozumieniu z lekarzem rodzinnym proszę czasowo odstawić te leki, bądź wprowadzić leczenie alternatywne.

• 7 dni przed planowanym zabiegiem nie powinno się stosować także leków p/ bólowych i p/zapalnych takich jak np.:

-**Aspirin, Maxipirin, Polopiryna, Etopiryna, Alka-setzer, Alka-prim, Pyramidon fast**

- **Ibalgin, Ibufen, Ibum, Ibuprofen, Nurofen, Ibumax, Ibupar, Iburapid, Ifenin, MIG**

- **Ketonal, Refastin, Ketoprofen, Profenid, Dexak, Kettese**

-**Aulin, Minesulin, Nimesil**

-**Arthrotec, Cetaflam, Diclac, Dicloabak, Dicloberl, DicloDuo, Diclofenac, Dicloratio, Diclorem, Dicuno, Majamil, Naklofen, Olfen, Voltaren, a także spożywać dużych ilości cebuli i czosnku.**

• Jeżeli z powodu cukrzycy lub innych schorzeń stosujecie Państwo preparaty metforminy (tj. **Avamina, Etforn, Formetcin, Glucophage, Metfogamma, Metformax, Metformin, Metifor, Siofor, Symformin, Xigduo, Synjardy, Komboglyze, Janumet, Ristfor, Eucreas**) lub inhibitory konwertazy angiotensyny (tj. **Accupro, Benalapril, Captopril, Cardiotensin, Dirotin, Ednyt, Enalapril, Enap, Enapress, Gopten, Inhibace, Lisiprol, Lotensin, Mapryl, Monopril, Polpril, Prestarium, Prinivil, Ramicor, Tensiomin, Tritace**) lub antagoniści receptora angiotensyny (**Aprovel, Atacand, Candepres Carzap Cozaar, Diovan, Ifimasta, Irbesartan Irprestan, Karbis Lakea, Lorista, Losacor, Losartic, Lozap, Micardis Pritor, Ranacand Rasoltan, Sarve, Telmizek, Teveten, Tezeo, Tolura, Valsartan, Valsacor, Xartan, Znacodar**) prosimy o zaprzestanie stosowania leku/leków na 24 h przed planowanym przyjęciem do szpitala. W tym czasie proszę ściśle przestrzegać wytycznych diety przeciwcukrzycowej(w razie wątpliwości proszę zasięgnąć rady lekarza rodzinnego).

• Jeżeli zażywają Państwo stale inne leki, proszę zabrać ich zapas do szpitala (**leki w oryginalnych opakowaniach**). Ogromna różnorodność stosowanych leków nie pozwala nam często zabezpieczyć ich

dla Państwa w czasie krótkiego pobytu w szpitalu.

- Jeżeli cierpią Państwo na poważne schorzenia serca, nadciśnienie, schorzenia endokrynologiczne (cukrzyca, choroby tarczycy), poważne schorzenia płuc, prosimy zabrać ze sobą aktualne **zaświadczenie** od leczącego lekarza specjalisty **o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym)**. W przypadku schorzeń tarczycy ważne jest posiadanie aktualnych (do 2 tygodni) wyników badań hormonalnych (TSH, fT3, fT4).
- Przed planowanym zabiegiem konieczne jest kompleksowe leczenie stomatologiczne. W przypadku zaawansowanych zmian próchnicznych uzębienia, operacja laryngologiczna nie będzie wykonana!
- Przed operacją należy zmyć lakier z paznokci (i odkleić ewentualne sztuczne paznokcie). Jest to konieczne do prawidłowego działania stosowanej przez nas aparatury medycznej.
- Przed planowym zabiegiem obowiązkowe jest wykonanie **szczepienia przeciwko WZW B** (żółtacze typu B). Potrzebny poziom odporności uzyskamy już po wzięciu drugiej dawki szczepionki. Sposób szczepienia (szybki lub standardowy) doradzi i będzie nadzorował lekarz rodzinny. Jeżeli nie pamiętacie Państwo czy byliście Państwo szczepieni, można wykonać badanie Anty-HBs, w którym określany jest poziom odporności na tego typu żółtaczkę.
- Prosimy zabrać ze sobą (jeżeli były wykonane) **wyniki (opisy) badań dodatkowych** takich jak: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania rentgenowskiego klatki piersiowej (jeżeli nie jest starsze niż rok). **Do operacji endoskopowych zatok niezbędna jest płyta CD z badaniem.**
- Celem przyjęcia do Oddziału należy zgłosić się **na czczo ok. godz. 8:00 do Kliniki Otolaryngologii** (w przypadku przyjęć w **niedzielę** należy zgłosić się **o godzinie 8:00 do Kliniki Okulistyki**).
- Typowo do szpitala należy zabrać ze sobą: piżamę, pantofle, szlafrok, ręczniki, przybory toaletowe. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie zabierać rzeczy wartościowych i dużych sum pieniędzy.
- Jeżeli z różnych przyczyn zrezygnujecie Państwo z zaplanowanego terminu leczenia - proszę o poinformowanie nas o tym pod nr tel. sekretariatu: **12 6308 183 / 518 809 146 / 797 058 802** lub na adres email : **laryngologia@5wszk.com.pl**
- **Przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym konieczne jest wykonanie badań przedzabiegowych oraz odbycie kwalifikacji anestezyjologicznej! Termin badań i data wizyty u lekarza anestezyjologa zostanie podana telefonicznie około 3 tygodnie przed przyjęciem. W razie braku odbycia przedzabiegowej kwalifikacji, a obecności czynników dyskwalifikujących z zabiegu w znieczuleniu ogólnym Klinika zastrzega sobie możliwość czasowej dyskwalifikacji z planowego zabiegu do czasu ustania przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego.**

Termin przyjęcia do szpitala: